a Gude N°13 observation
d'une descente de L'intestin 22 X.bre 1771.
Côlon par L'anus —

je fus appellé Le 22 du mois de décembre dernier pour voir une fille âgée d'environ trente cinq ans. étant arrivé chez-elle je demandai quel étoit son mal: on me dit qu'il Lui sortoit un Boyeau par L'anus. tous ses parens étoient alarmez je Leur dis que cela ne seroit rien que c'étoit apparemment L'intestin ~~Rectum~~ qui s'étoit renversé. je demandai de L'huile pour en faire La reduction jugez quelle fut ma Surprise Lorsqu'ayant decouvert La Malade pour aller à L'operation je dis que c'étoit une grande portion de L'intestin Colon qui étoit descendue par L'anus. L'intestin étoit fort brunâtre on appercevoit une portion du Mesentere et beaucoup de graisse fort rousse. je respoussai L'intestin dans Le rectum; La reduction étant faite. je demandai a La malade de quelle façon cela Lui étoit survenu; elle me dit qu'il y avoit environ deux ans et demi qu'ayant voulu soulever une gerbe de bled fort pesante, elle sentit quelque chose qui Lui creva dans dans Le Corps. et que quelques heures après étant allée à ses nécessités, elle avoit senti quelque chose qui Lui étoit descendu par L'anus et qu'elle L'avoit respoussé; et que du depuis toutes les fois qu'elle alloit à La selle cela ressortoit et qu'elle le faisoit rentrer chaque fois. mais souvent avec bien de La difficulté et des douleurs repandant chaque fois du sang ne sçachant point ce que c'étoit elle ne L'avoit dit à personne Le jour qu'on m'envoya chercher elle avoit fait tous ses efforts pour Le reduire Mais inutilement parceque L'intestin

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 56
n°13

étoit sorti plus que de coutume. après que je luy en eu —
fait la reduction elle soffrit beaucoups et eut de la fievre
pendant quelque jours, rien ne passoit alors par le bas. et il
y avoit des simptômes d'etranglement, c'est pourqui je dis —
à la malade que si son ventre ne s'ouvroit pas il faudroit
lui faire une ~~incision~~ incision au ventre pour aler segir
l'intestin avec la main pour le retirer de dedans le
rectum, elle me repondit à cela qu'elle aimeroit mieux —
mourir que de souffrir une pareille opération. pendant
ces entrefaites son ventre se débonda et elle se porte beaucoups
mieux apresent. mais l'intestin resort toutes les fois qu'elle
va à la selle et elle le fait rentrer chaque fois comme
elle faisoit auparavent. de quelle facon l'intestin a pu —
passer dans le rectum pour venir sortir par l'anus —
la raison en est claire, il falut qu'un boyeau soit —
crévé pour avoir donné entrée à l'autre. la facon de
guerir cette incommoditte est aussi fort claire, il est seuré —
qu'il faudroit faire une incision au ventre pour pouvoir
saisir l'intestin pour le retirer de dedans l'autre et lui —
faire contracter des adhérences avec la playe pour qu'il
ne pû pas redescendre, s'il étoit possible de pouvoir —
attendre jusqu'à la crevasse de l'intestin il vaudroit mieux
faire à cette crevasse quelque points de suture. je propose
ici une question si en pareil cas on ne pourroit pas faire
une incision au sphinter de l'anus pour pouvoir introduire
la main dans le rectum pour reduire l'intestin

Dupuy de Loreilhe